

貝毒プランクトン調査

| 調査年月日 | 平成30年12月25日 | | 単位: cells/ml | | | | | |
|-------------------|---|----|--------------|-------|----|----|----|----|
| 種類 | /地点番号 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
| | | 北灘 | 家串 | 御荘 | 船越 | 福浦 | 赤水 | 内泊 |
| 5m水温(°C) | | | | 18.5 | | | | |
| 珪藻類 | | | | | | | | |
| 〈貝毒プランクトン〉 | | | | | | | | |
| アレキサンドリウム属 | | | | 0.027 | | | | |
| ギムノディニウム・カテナータム | | | | 0.031 | | | | |
| ディノフィシス・カウダーダ | | | | 0 | | | | |
| 〈有害プランクトン〉 | | | | | | | | |
| カレニア・ミキモトイ | | | | 0 | | | | |
| コクロディニウム・ポリクリコイデス | | | | 0.487 | | | | |
| 状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・採水は0~7m柱状採水で1000倍濃縮し、検鏡 ・まひ性貝毒原因種のギムノディニウム・カテナータムの危険濃度は0.1cells/mlです。 | | | | | | | |

